

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию лосьона-спрея противопедикулезного «ПерМин новый» для уничтожения головных вшей населением в бытовых условиях

(производитель ЧАО «Технолог», Украина)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА**

№ 05.03.02-08/689 от 16.10.2013 р.

1 Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» предназначен для использования населением в бытовых условиях с целью уничтожения головных вшей. Состав, масс. %: перметрин 1,00 (действующее вещество); изопарафин C₁₀-C₁₁ (изопар) 38,00; масло минеральное 36,00; спирт изопропиловый 24,00; отдушка 1,00.

2 Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» представляет собой прозрачную жидкость без посторонних примесей от бесцветной до светло-желтого цвета с запахом использованной отдушки и спирта.

3 Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» проявляет инсектицидную и овоцидную активность относительно головных вшей.

4 Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» относится к малоопасным веществам при введении в желудок и при нанесении на кожу (4 класс безопасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). Средство не проявляет кожно-раздражающих и сенсибилизирующих свойств. В нативной форме вызывает слабое раздражение слизистой оболочки глаз.

5 Лосьон-спрей противопедикулезный «ПерМин новый» предназначен для уничтожения головных вшей (имаго, личинки, яйца) населением в бытовых условиях.

6 Способ использования: голову моют обычным шампунем, промывают водой и просушивают полотенцем. Для обработки взрослых лиц на высушенные волосы и кожу волосяной части головы равномерно распыляют средство путем коротких нажатий на распылительную головку упаковки и тщательно втирают в корни волос. Во время распыления средства упаковку необходимо держать на расстоянии 3 см от волос. Для обработки детей средство наносят на ватный, марлевый тампоны, спонж или губку путем коротких нажатий на распылительную головку упаковки, равномерно распределяют средство по всей длине волос и тщательно втирают в корни волос. Норма расходов средства составляет 30-50 см³ на одну обработку (в зависимости от длины и густоты волос). С целью предотвращения попадания средства на слизистую оболочку глаз, носа и ротовой полости используют жгут из хлопковой ткани, который обвязывают вокруг головы по границе волосяной части. Через 10 мин средство смывают проточной теплой водой в течение 2-3 мин, потом моют с использованием шампуня или мыла. Волосы тщательно расчесывают при помощи гребня с целью удаления погибших насекомых и гнид (яиц). Повторную обработку проводят по показаниям, но не ранее чем через 7 суток.

7 Меры предостережения при использовании: средство используют только наружно. Средство не подлежит использованию для обработки волос детям до 3 лет, беременных женщин, женщин-кормилиц, лицам с повреждением кожи головы (царапины, раны, раздражения на пораженных педикулезом участках тела), а также лицам, проявляющим повышенную чувствительность к средству или склонным к аллергическим заболеваниям. Обработку волос детей проводят взрослые. Обработку волос проводят вдали от источников открытого огня и тепла. Во время обработки волос необходимо придерживаться требований личной безопасности, направленных на предотвращения попадания лосьона на открытые участки кожи и на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Запрещается принимать пищу, напитки и курить во время проведения работ по обработке волос средством. После нанесения средства на волосы необходимо вымыть лицо и руки водой с мылом.

В случае появления симптомов плохого самочувствия необходимо немедленно прекратить обработку лица, пораженного педикулезом, вывести потерпевшее лицо на

свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, тепло, освободить от тесной одежды. При случайном попадании средства в глаза необходимо промыть глаза проточной водой в течение 10-15 мин. В случае случайного попадания средства на открытые участки кожи необходимо промыть загрязненный участок кожи проточной водой. При попадании средства на одежду необходимо снять ее, а участок кожи под одеждой промыть водой. В случае случайного проглатывания средства необходимо немедленно выпить несколько стаканов воды, содержащей 10-15 измельченных таблеток активированного угля, а потом путем раздражения задней стенки глотки вызвать рвоту. После промывания желудка необходимо обратиться к врачу.

8 Упаковка: для бытового применения средство упаковывают во флаконы полимерные и флаконы стеклянные объемом 50-200 мл.

9 Транспортирование: средство транспортируют всеми видами транспорта согласно правилам перевозки грузов, действующие на транспорте данного вида.

10 Хранение: в бытовых условиях средство хранят в упаковке производителя в хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от включенных отопительных приборов при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от источников солнечных лучей и источников открытого огня и тепла, отдельно от продуктов питания, напитков, лекарственных средств, кормов для животных. Средство хранят в местах, недоступных детям и домашним животным.

На предприятиях общественной торговли и у субъектов предпринимательской деятельности, которые представляют населению услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, средство хранят в упаковке производителя на расстоянии не менее 0,5 м от включенных отопительных приборов при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от источников солнечных лучей. Средство хранят отдельно от лекарственных средств, продуктов питания, напитков, кормов для животных, в недоступном для детей и животных месте.

11 Срок годности: 3 года от даты изготовления.

12 Освобожденную от содержимого упаковку утилизируют через мусоросборники.