

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
**21.10.11 № 685**  
**Регистрационное удостоверение**  
**№ UA/4637/01/01**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**БРОМКАМФОРА**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* bromcamphora;

1 таблетка содержит бромкамфоры 250 мг (0,25 г);

*вспомогательные вещества:* крахмал картофельный, магния стеарат, стеариновая кислота, натрия кроскармеллоза, повидон.

**Лекарственная форма.** Таблетки.

Таблетки белого или белого с сероватым оттенком цвета, с запахом камфоры. На поверхности допускается наличие мраморности.

**Название и местонахождения производителя.** АО «Лекхим-Харьков».  
Украина, 61115, г. Харьков, ул. 17-го Партсъезда, 36.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Снотворные и седативные препараты. Бромиды.

Код АТС N05C M11.

Бромкамфора – седативное средство. Как и другие бромиды, обладает способностью концентрировать и усиливать процессы торможения в коре головного мозга, особенно при повышенной возбудимости центральной нервной системы. Облегчает наступление естественного сна. Нормализует сердечную деятельность.

Бромкамфора легко всасывается слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта и распределяется в организме, накапливаясь в основном во внеклеточной жидкости. Накопление брома в организме зависит от баланса хлоридов: при дефиците солей хлора бромиды накапливаются в больших количествах, частично заменяя хлориды; избыточное поступление хлоридов препятствует накоплению бромидов. Выводятся бромиды медленно почками. Выведение из организма может продолжаться до 2 месяцев, при нарушении функции почек выведение замедляется.

**Показания к применению.**

Повышенная нервная возбудимость, неврастения, истерия, бессонница, астенический синдром, хорея, кардионевроз, начальная стадия гипертонической болезни.

**Противопоказания.**

Гиперчувствительность к камфоре или бромидам, печеночная и/или почечная недостаточность.

**Особые предостережения.**

При длительном применении возможно развитие толерантности. При приеме препарата на фоне диеты с ограничением потребления с пищей поваренной соли (до 5-10 г соли) возможно усиление седативного эффекта.

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Препарат противопоказан для применения в период беременности или кормления грудью.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не следует применять препарат из-за возможной сонливости и снижения концентрации внимания.

**Дети.** Препарат противопоказан для применения детям до 7 лет.

**Способ применения и дозы.** Назначают внутрь после еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1-2 таблетке (250-500 мг) 2-3 раза в сутки, детям в возрасте 7-10 лет – по 1 таблетке (250 мг) 2 раза в сутки, детям в возрасте 10-14 лет – по 1 таблетке (250 мг) 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза: для взрослых – 1,5 г; для детей в возрасте 7-10 лет – 500 мг; для детей в возрасте 10-14 лет – 750 мг. Курс лечения – 10-15 дней.

**Передозировка.** *Симптомы:* раздражительность, атаксия, ослабление памяти, дизартрия, тахикардия, расширение зрачка, конъюнктивит, ринит, обложенный язык, тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры тела, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, кома.

*Лечение:* промывание желудка, назначение солевых слабительных и активированного угля внутрь. Судороги купируются медленным внутривенным введением диазепама или быстродействующих барбитуратов. Рекомендуется гемодиализ с липидным диализатором.

#### **Побочные эффекты.**

Заторможенность, сонливость, диспептические явления, аллергические реакции, кожные высыпания.

При длительном применении каких-либо бромидов возможно развитие «бромизма» (насморк, кашель, конъюнктивит, вялость, ослабление памяти).

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Потенцирование эффекта наблюдается при одновременном приеме с препаратами, угнетающими центральную нервную систему.

**Срок годности.** 2 года.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше +25 °С.

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**